

Vejledning til patienter med diabetes I (insulinbehandlet)

Fasteblodsukker måles hjemme om morgenen.

Det tilstræbes, at blodsukkeret ligger mellem 4 og 12.

Blodsukker under 4	Drikkes et glas sødt saft
Blodsukker mellem 4 og 12	Kan man drikke et glas vand
Blodsukker over 12	Skal der gives 2 e.i. insulin med pen
Blodsukker over 16	Kontakt tandklinikken

Insulin-pen medbringes til tankklinikken.

Blodsukkeret vil blive målt under indgrebet, hvis varigheden af behandlingen er over en time, samt efter behandlingen.

Det er vigtigt, at du drikker og spiser hurtigt efter behandlingen for at indstille dig til dit normale insulinbehov.

Vejledning til patienter med diabetes II (tabletbehandlet)

Fasteblodsukker måles hjemme om morgenen.

Blodsukker under 4	Drikkes et glas sødt saft
Blodsukker mellem 4 og 12	Kan man drikke et glas vand
Blodsukker over 12	Tages den sædvanlige morgendosis af diabetes tabletter.
Blodsukker over 16	Kontakt tandklinikken

Blodsukkeret vil blive målt under indgrebet, hvis varigheden af behandlingen er over en time, samt efter behandlingen.

Insulin im/glucose gives afhængig af måleværdier.

Det er vigtigt, at du drikker og spiser hurtigt efter behandlingen for at indstille dig til dine vanlige antidiabetes tabletter.