

Vejledning ved tandbehandling i generel anæstesi (narkose)

1. Du skal være fastende 6 timer før behandlingen.
2. På behandlingsdagen anbefales det, at du drikker vand, saftvand, eller andre klare væsker indtil 2 timer før den aftalte tid. Der må **IKKE** drikkes mælkeprodukter.
3. Du må indtage din sædvanlige morgenmedicin – dog ikke vanddrivende medicin. Vi vil foreslå, at du tager 2 Pamol 2 timer før behandlingen.
4. Når tandbehandlingen er overstået, bliver du observeret af en sygeplejerske. Typisk vil der gå ½ til 1 hel time, før du kan tage hjem.
5. Efter at have forladt klinikken kan du spise eller drikke frit – hvis tandbehandlingen tillader det. Ved længere transport kan det dog være klogt at vente med at spise, til du er kommet hjem.
6. Du må ikke selv køre bil på behandlingsdagen. Sørg for at få en til at hente dig. Du skal selv sørge for hjemtransport.
7. Da der i sjældne tilfælde kan ses eftervirkninger som kvalme, svimmelhed eller utilpashed, må du **IKKE** være alene i cirka 1 døgn efter behandlingen.
8. Skønnes der at være behov for beroligende medicin inden behandlingen, aftales dette med klinikken/narkoselægen.
9. Huske at få ”tisset af” inden behandlingen. Der kan forekomme ufrivillig vandladningen under behandlingen, evt. skiftetøj medbringes.
10. Piercing ved næse og i mund skal fjernes inden generel anæstesi.
11. På narkosedagen skal du være kontaktbar/ ved telefon for evt. ændring af tidspunkt.
12. Er der tvivl om noget, så kontakt os endelig og spørg:
www.dreamteamsyd.dk/kontakt-os